POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
Pracownia Badań Endoskopowych
46-200 Kluczbork
Tel. 77 4173532

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA PROCEDURĘ MEDYCZNĄ

ZGODA NA KOLONOSKOPIĘ

Badane, które Pani/panu proponujemy wymaga Pani/Pana zgody. Aby ułatwić decyzję, informujemy Panią/Pana o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania.
KOLONOSKOPIA – daje możliwość endoskopowej oceny jelita grubego za pomocą giętkiego aparatu. W trakcie badania, w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych, istnieje możliwość pobrania wycinko oraz usunięcie drobnych kilkumilimetrowych polipów.

JAK PRZEPROWADZA SIĘ BADANIE

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita za pomocą doustnych środków przeczyszczających. W czasie kolonoskopii pacjent leży na boku, aparat wprowadza się przez odbyt. W czasie badania podaje się powietrze do światła jelita, aby lepiej uwidocznić jego ściany. Może to być powodem uczucia wzdęcia, dyskomfortu. Badanie może być również przejściowo bolesne. Stale utrzymujący się ból może być wskazaniem do odstąpienia od dalszej oceny jelita. Pobieranie wycinków i usuwanie drobnych polipów jest bezbolesne. Każdy instrument do badania jest dezynfekowany, a szczypczyki służące do pobierania wyników sterylizowane, co zabezpiecza przed zakażeniem.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Powodzenie badania oraz bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania zdarzają się jednak rzadko (0,2%). Należy do nich przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (0,1%), krwawienie (0,008%), które zwykle wymaga natychmiastowej operacji. Powikłania częściej występują u osób starszych oraz z uchyłkami jelita grubego.
Aby ograniczyć ryzyko związane z proponowanym badaniem prosimy o odpowiedź na następujące pytania (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):

1.	Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień?	**TAK**	**NIE**
2.	Czy pobiera Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi? (jeżel TAK to jakie?)……	**TAK**	**NIE**
3.	Jeżeli były przyjmowane leki wpływające na krzepliwość krwi, kiedy zostały odstawione?	…….	
4.	Czy ma Pani/Pan wszczepiony stymulator serca lub kardiowerter?	**TAK**	**NIE**

POSTĘPOWANIE PO BADANIU

W przypadku stosowania znieczulenia nie należy jeść i pić przez okres 2 godzin po zabiegu, w okresie bezpośrednio po znieczuleniu wskazana jest opieka drugiej osoby, nie wolno w tym dniu prowadzić pojazdów mechanicznych. Wystąpienie po badaniu niejasnych objawów (utrzymujących się bólów brzucha, krwawienia) należy zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.
Prosimy pytać, jeśli coś jest dla Pani/pana niejasne.

OŚWIADCZENIE PACJENTA:

Wyrażam zgodę na wykonanie proponowanego badania, jak również na ewentualnie pobranie wycinków lub usunięcie drobnych polipów. Rozumiem także, że założony cel badania może nie zostać osiągnięty.

Imię i nazwisko ……

Data i podpis ……

PESEL
……

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
Pracownia Badań Endoskopowych
46-200 Kluczbork
Tel. 77 4173532

Przygotowanie do kolonoskopii

1. Zakupić preparat oczyszczający jelito przed badaniem – polecana Clensia, Citrafleet lub Moviprep; w przypadku złego oczyszczenia jelita w poprzednich badaniach polecany Fortrans. Leki te wydawane są na receptę – powinien ją wystawić lekarz kierujący na badanie.
2. W ciągu co najmniej 5 dni poprzedzających badanie nie należy spożywać owoców zawierających drobne pestki (winogrona, jabłka, kiwi, porzeczki itp.), pieczywa ziarnistego, ciast z drobnymi ziarnami (mak, sezam itp.)
3. W dniu poprzedzającym badanie zaleca się dietę bezresztkową – kisiele, budynie, twarogi, jajka, czysty bulion, można pić niegazowaną wodę mineralną, herbatę, klarowny (bez drobin miąższu owocowego) sok jabłkowy; nie należy pić soków o silnym zabarwieniu (buraczany, wiśniowy itp.).
4. W momencie rozpoczęcia stosowania środka przeczyszczającego całkowicie zaprzestajemy spożywania jakichkolwiek posiłków oprócz czystych (klarownych) płynów.
5. Należy przygotować roztwór środka przeczyszczającego w wodzie wg załączonej ulotki, w trakcie przeczyszczenia oprócz tego roztworu pijemy także zwykłą wodę wg zaleceń zamieszczonych w ulotce tak aby łączna ilość spożytego w trakcie przygotowania do badania płynu wyniosła 4 litry. Połowę tej ilości płynu (2 litry) z połową ilości środka przeczyszczającego zawartego w zakupionym zestawie należy wypić w dniu poprzedzającym badanie – w godzinach wieczornych między 19.00 a 21.00. Pozostałą część płynu (kolejne 2 litry z drugą połową środka przeczyszczającego) należy wypić rano w dniu badania w ciągu dwóch godzin - przygotowanie należy tak zaplanować, aby skończyć picie na minimum 4 godziny przed wyznaczoną godziną badania. Biegunka zwykle ustępuje w ciągu 2 godzin od zakończenia picia środka przeczyszczającego – mamy więc przynajmniej 2 godziny czasu na przejazd do pracowni endoskopowej.
6. Przez ostatnie co najmniej 4 godziny przed badaniem zostajemy całkowicie na czczo – nie wolno już wtedy spożywać nawet płynów.
7. Przed kolonoskopią wskazane jest odstawienie leków zmniejszających krzepnięcie krwi. Wskazana konsultacja z lekarzem prowadzącym to leczenie odnośnie możliwości odstawienia tych leków, czasu odstawienia przed kolonoskopią oraz ewentualnej konieczności wprowadzenia leków zastępczych. W przypadku heparyny wstrzykiwanej podskórnie – rano w dniu badania wstrzyknięcia nie stosujemy.
8. Doustne leki przeciwcukrzycowe wymagają odstawienia w przeddzień badania, w przypadku stosowania insuliny jej dawka wymaga znacznego zmniejszenia – należy wcześniej skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
9. W przypadku pobierania leków na nadciśnienie i nasercowych można zażyć poranną dawkę leków popijając ją jednym łykiem wody – należy zrobić to po ustaniu biegunki spowodowanej środkiem przeczyszczającym.
10. Badanie będzie wykonane w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym (uśpieniu) – nie wolno po nim prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych.
11. Prosimy o przybycie na badanie z osobą towarzyszącą.

TERMIN BADANIA: ……